

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Institut Technique des Cultures Maraîchères et Industrielles



FICHE TECHNIQUES VALORISÉE
DES CULTURES MARAÎCHÈRES
ET INDUSTRIELLES

La culture de CAROTTE

ITCMI 2010


	الجزر	
	CAROTTE	
	ARROT	
Nom botanique	<i>Dacus carota</i>	
Famille:	<i>Apiacées</i>	
Espèce originaire de l'Asie mineure.		

I. PLANTE

- Température de germination optimum : 27°C.
- Température minimale de levée : 5°C.
- Nombre de graines dans 1g : 900.
- Longévité moyenne de la graine : 4 -5 ans
- Quantité de semence nécessaire pour 1 ha :
 - Semis direct : 4 à 5 kg
 - Semis de précision : 2,5 à 3 kg (graines enrobées).
- Cycle végétatif : 60 à 90 jours.

II. STADES PHENOLOGIQUES

- 09 : Stade levée.
 10 : Cotylédons étalés ; point végétatif apicale ou initiales des premières vraies feuilles.
 13 : 03 feuilles étalées.
 43 : Racine, tiges (30 % de leur taille finale).
 61 : début de la floraison.
 75 : Maturité.



III. VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Super muscade, Muscade, Touchon - Nantaise amélioré, Napoli, Presto, Premia...

IV. EXIGENCES

- Aime les sols légers, sableux, profonds bien ameublés et drainant.
- pH : 6 à 7,5
- Salinité : tolérante au sel 1,92g/l à 3,25g/l (3 à 5mmhos / cm⁻¹)

V. ZONES DE PRODUCTION

Très répandue dans les régions du littoral (Alger Boumerdes Mostaganem),
Les hauts plateaux (M'sila- Oum el bouaghi, Sétif) et le sud (Adrar-Biskra-Ghardaia-El oued)

VI. MISE EN PLACE DE LA CUL

6.1. PREPARATION DU SOL

- Epannage fumure de fond.
- Labour 25-30cm.
- Reprise avec un vibroculteur.



6.2. SEMIS

La carotte se caractérise par des semis échelonnés. Peut être semée durant toute l'année, néanmoins les semis sont concentrés en mois novembre, décembre, janvier.

Distances de plantation

Semis en vassaux ou à la volée

Semis en ligne : mécanique.

Densité : 1.200. 000 à 1.600. 000 plants / ha (semis direct)


2.000.000 à 2.400 000 plants / ha (semis de précision)

6.3. ENTRETIEN DE LA CULTURE

Désherbage

6.4. FERTILISATION

- **Fumure de Fond** : (organique peu conseillée)
Minérale : 150 à 200 unités de N / ha
200 à 250 unités de K / ha
100 à 120 unités de P (super 46%) / ha
- **Fumure d'entretien** : 1 seul apport après la levée 50 unités de N.



6.5. IRRIGATION

Les irrigations se font par submersion (vassaux) ou par aspersion.
Les besoins sont estimés à **5000 m³/ ha**.

VII. PROTECTION SANITAIRE

INSECTICIDE

Pucerons : Méthomyl 25% wp



Mouche de la carotte : Phosalone 4% dp



FONGICIDE



Odium: Benomyl 50% wp



Sclérotinia ↑ Prodione sc

NEMATICIDE

Nématodes →
Mocap, Dazomet



HERBICIDE

Linuron WP 50 % : 1,5 kg / ha

VIII - RECOLTE

Manuelle ou mécanique :

Rendements : 30 à 40 t / ha.



FTV : LA CULTURE DE CAROTTE (1 HA)
RDT : 250 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre jours	Coût unitaire	Montant DA	Nbre heure	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I Semence	-	-	-	-	-	-	4 kg	1000	4000	4000
S/T	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	4000
II- Préparation du sol										
- Epannage fumier + NPK	0,5	600	300	4	500	2000	15 T	1200	24000	26300
							10 qx	6000	60000	60000
- Labour	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
- Disquage	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
- Passage fraise rotative	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
- Confection planches	10	600	6000	-	-		-	-		6000
S/T	13	-	7800	24	-	12000	-	-	78000	97800
III- Plantation et entretien :										
- Plantation (semis en ligne)	15	600	9000	-	-		-	-		9000
- Irrigations (aspersion)	10	600	6000	-	-		3000 m3	4	12000	12000
- Entretien (désherbage)	2	600	1200	8	500	4000	20 l	100	2000	7200
- Traitements phytosanitaires Fong+Insect	4	600	2400	16	500	8000		-	15000	25400
- Fumure couverture	0,5	600	300	-	-		1 qx d'N	6000	6000	6300
S/T	31,5	-	18900	24	-	12000	-	-	41000	71900
IV- Récolte et transport :										
- Récolte	18	600	10800	-	-		-	-		10800
- Transport	4	600	2400	20	500	10000	-	-		12400
S/T	22	-	13200	20	-	10000	-	-		23200
Total Général	66,5	-	39900	68	-	34000	-	-	123000	196900